



|     | 当院全体  |       |
|-----|-------|-------|
|     | 褥瘡保有率 | 褥瘡発生率 |
| 4月  | 4.1%  | 0.0%  |
| 5月  | 4.0%  | 1.2%  |
| 6月  | 7.1%  | 3.5%  |
| 7月  | 6.8%  | 2.3%  |
| 8月  | 2.8%  | 1.2%  |
| 9月  | 4.1%  | 1.1%  |
| 10月 | 4.2%  | 0.0%  |
| 11月 | 7.0%  | 1.1%  |
| 12月 | 4.2%  | 1.2%  |
| 1月  |       |       |
| 2月  |       |       |
| 3月  |       |       |



|     | 当院全体 |       |
|-----|------|-------|
|     | 保有患者 | 新規発生者 |
| 4月  | 3名   | 0名    |
| 5月  | 3名   | 1名    |
| 6月  | 5名   | 3名    |
| 7月  | 5名   | 2名    |
| 8月  | 2名   | 1名    |
| 9月  | 3名   | 1名    |
| 10月 | 3名   | 0名    |
| 11月 | 5名   | 1名    |
| 12月 | 3名   | 1名    |
| 1月  |      |       |
| 2月  |      |       |
| 3月  |      |       |



|       | 年間平均  |       |
|-------|-------|-------|
|       | 褥瘡保有率 | 褥瘡発生率 |
| 2019年 | 7.1%  | 2.4%  |
| 2020年 | 7.9%  | 2.9%  |
| 2021年 | 6.6%  | 1.7%  |
| 2022年 | 5.3%  | 1.4%  |
| 2023年 |       |       |

